

Deralbine® Nitrato de Miconazol 1,526%

Andrómaco

Venta bajo receta
Industria Argentina

polvo en spray

USO EXTERNO

Fórmula:

Cada 100 g contiene: Nitrato de Miconazol 1,526 g (equivalente a 1,325 g de Miconazol); Excipientes (BHA 0,100 g; Miristato de Isopropilo 0,500 g; Polisorbato 80 0,500 g; Esencia de Lavanda 0,500 g; Óxido de Zinc 10,000 g; Alcohol Etilico 8,615 g; Propelente HFC 134A c.s.p. 100,000 g).

Acción terapéutica:

Antimicótico de amplio espectro.

Indicaciones:

Dermatomicosis causadas por dermatofitos o levaduras, con o sin sobreinfección por bacterias Gram positivas: Tinea pedis, Tinea manuum, Tinea corporis, Tinea inguinalis, Tinea cruris, intertrigo, candidiasis, vulvitis, balanopostitis. Pityriasis versicolor.

Características farmacológicas/Propiedades:

Acción farmacológica: Es un fungistático, aunque puede ser fungicida con dependencia de la concentración. Actúa por inhibición de la biosíntesis del ergosterol o de otros esteroides, lo que lesiona la membrana de la pared celular fúngica y altera su permeabilidad; como consecuencia, puede producirse la pérdida de orgánulos intracelulares esenciales. Inhibe también la biosíntesis de triglicéridos y fosfolípidos de los hongos, y la actividad de las oxidasas y peroxidases, que da como resultado un aumento intracelular de concentraciones tóxicas de peróxido de hidrógeno, lo que puede contribuir a la necrosis celular. En Candida albicans inhibe la transformación de las blastosporas en la forma inicial invasora. Ejerce acciones curativas en las micosis superficiales.

Farmacocinética: Se absorbe muy poco por la piel intacta y algo más por la piel lesionada cuando se aplica por vía tópica. La porción absorbida sufre una importante biotransformación en el organismo, pero no se conocen bien los metabolitos formados. Ellos y las drogas intactas se excretan por la orina y las heces.

Tasa de absorción: La absorción por vía tópica es inferior al 0.1% de la dosis.

Unión a proteínas plasmáticas: La unión a las proteínas plasmáticas es del 90% aproximadamente.

Vida media de eliminación: La vida media de eliminación es de 24 hs.

Eliminación: Los metabolitos formados en la biotransformación y la droga se excretan por la orina y las heces.

Eliminación por diálisis: No se acorta significativamente la vida media por hemodiálisis.

Posología:

Modo de empleo: Aplicar sobre la lesión dos veces por día. En pie de atleta y otras micosis del pie se puede evitar la reinfección pulverizando con Deralbine Spray el interior del calzado. Con el fin de evitar recidivas, es importante continuar el tratamiento durante 1 ó 2 semanas luego de desaparecidas las lesiones.

PR 1029706
PH 319

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad a cualquier componente de la formulación.

Advertencias:

Excepcionalmente puede presentarse hipersensibilidad a la droga. Si ocurriera debe suspenderse su uso.

Precauciones:

Interacciones: No se han observado interacciones.

Trastornos de la fertilidad: No existe documentación en seres humanos.

Embarazo: No existen datos sobre problemas generados en seres humanos.

Lactancia: No existen estudios en seres humanos.

Empleo en pediatría: Se desaconseja su uso en menores de dos años.

Empleo en ancianos: No se han realizado estudios adecuados sobre la edad y los efectos del Miconazol por vía tópica en geriatría. Sin embargo, hasta la fecha no se han registrado problemas específicos relacionados con el empleo en ancianos.

Reacciones adversas:

Deralbine Spray es bien tolerado excepcionalmente puede presentarse rash cutáneo, formación de ampollas, prurito o eritema en la zona de aplicación.

Sobredosificación:

Ante la eventualidad de ingestión accidental concurrir al hospital más cercano o comunicarse con el centro toxicológico del Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez, Tel. (011) 4962-6666/2247; Hospital A. Posadas, Tel. (011) 4654-6648 ó 4658-7777.

Presentación:

Envase con 90 g.

Condiciones de conservación y almacenamiento:

Conservar a temperatura ambiente menor de 30°C.
Evitar el contacto con los ojos o mucosas.

Agitar energicamente antes de usar.

No arrojar al incinerador. No pulverizar sobre llama.

No exponer a temperaturas mayores de 40°C o a congelamiento. No perforar el envase. Prohibido su relleno.

Advertencia: En caso de obturación, enjuagar la válvula con agua caliente.

"Mantener este y cualquier otro medicamento fuera del alcance de los niños".

Especialidad Médica Autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado N° 34.996.
Director Técnico: Eduardo R. Nasuti, Farmacéutico.

Fecha de última actualización del prospecto: 01/04.



Este producto no afecta
la capa de ozono.



Andrómaco

Laboratorios Andrómaco S.A.I.C.I.
Av. Ing. Huergo 1145 - C1107AOL - Bs. As.

Servicio de Atención al Consumidor:
0810-666-PIEL (7435)
E-mail: piel@andromaco.com.ar
www.andromaco.com