

Verrutopic AS[®] Ácido Salicílico 15%

Andrómaco

Venta bajo receta apósitos impregnados en gel
SISTEMA DE APLICACIÓN POR APÓSITO DÉRMICO

Fórmula:

Cada apósito dérmico contiene:

Ácido Salicílico 15% impregnado en forma homogénea sobre un apósito adhesivo compuesto por Goma Karaya 2,0%, Polietilenglicol 300 40,0%, Propilenglicol 42,9% y Quaternium 15 0,1%.

Cada apósito está cubierto por una película de polietileno que actúa como barrera contra la humedad.

El kit viene provisto de tiras adhesivas, protectores periféricos hipoalergénicos y una lima.

Acción terapéutica:

Queratolítico.

Indicaciones:

VERRUTOPIC AS ha demostrado eficacia clínica en la eliminación de verrugas comunes.

Características farmacológicas / Propiedades:

Acción farmacológica: Si bien no se conoce el mecanismo exacto de acción del Ácido Salicílico en el tratamiento de las verrugas, su actividad parece deberse a su acción queratolítica, que resulta de la eliminación en forma mecánica de las células del stratum corneum infectadas con el papiloma virus.

Propiedades: El sistema de aplicación por apósito dérmico ha sido diseñado para ser aplicado sobre el tejido de las verrugas y proporcionar una administración homogénea y constante del Ácido Salicílico durante un período de tratamiento de 8 hs. Esta aplicación proporciona una liberación más constante de la droga al stratum corneum que aquellas fórmulas tradicionales de colodión líquido que tienden a descargar su concentración de Ácido Salicílico a medida que el solvente se va evaporando.

Cada apósito está cubierto por una película de polietileno que actúa como barrera contra la humedad creando un benéfico efecto oclusivo, que permite una mejor penetración de la droga activa, así como una mayor formación de costra del tejido queratinizado de la verruga.

Precauciones y advertencias:

No utilizar este producto sobre piel irritada, ni sobre área alguna que se encuentre infectada o inflamada. Tampoco debe ser empleada en el caso de personas que padezcan diabetes mellitus o insuficiencia circulatoria, ya que puede producir inflamación aguda o ulceración. En caso de persistir las molestias, debe consultarse al médico. No debe ser utilizado sobre lunares, marcas de nacimiento, verrugas en las que nace vello, verrugas genitales, verrugas faciales ni sobre membranas mucosas. Interrumpir su aplicación en caso de aparecer irritación excesiva del área de piel que la rodea. No está recomendado en niños menores de 2 años, excepto expresa indicación médica en contrario.

Teratogénesis: Estudios llevados a cabo en ratas y monos no demostraron actividad teratogénica en el Ácido Salicílico.

Niños: No se han documentado inconvenientes en los estudios llevados a cabo en niños.

Ancianos: No hay información disponible.

Interacciones: El uso simultáneo con preparaciones antiacnéicas que contengan Resorcinol, Azufre, Tretinoína, lociones astringentes, Peróxido de Benzoílo, cosméticos o maquillajes, pueden tener un efecto desecante o irritante acumulativo y producir una irritación excesiva de la piel. Si se produjera una absorción sistémica significativa de Ácido Salicílico tópico, el uso simultáneo de otros salicilatos podría aumentar el riesgo de salicilismo.

Reacciones adversas:

Irritación cutánea no presente antes del tratamiento. Si los apósitos VERRUTOPIC AS se aplican sobre la piel sana que rodea al tejido de la verruga y aparece irritación localizada, se deberá interrumpir temporariamente el tratamiento hasta la desaparición de la sintomatología. Al reiniciar el tratamiento, los apósitos VERRUTOPIC AS deben ser recortados cuidadosamente de modo que al aplicarlos sólo tomen contacto con el tejido de la verruga.

Signos de salicilismo: confusión, mareos, cefaleas severas o continuas, taquipnea o zumbido en los oídos.

Contraindicaciones:

Deberá evaluarse la relación riesgo beneficio en presencia de diabetes mellitus, enfermedad vascular periférica e inflamación o infección cutánea.

Posología y forma de administración:

Se recomienda aplicar a la noche, antes de acostarse.

1) Proceder a lavar cuidadosamente el área afectada. Secar. Eliminar todo material extraño, así como piel seca y muerta utilizando la lima incluida en el envase.

2) Retirar el apósito despegándolo de la tira, dejando en su lugar la película plástica azul y recortar para ajustarlo al tamaño de la verruga.

IMPORTANTE: El apósito debe ser recortado tomando la precaución de que cubra la verruga por completo, sin entrar en contacto con la piel sana.

3) Aplicar una gota de agua tibia sobre la verruga, tomando la precaución de conservar seca la piel circundante.

4) Aplicar el apósito al acostarse, con la cara de color azul hacia el exterior y la cara adhesiva en contacto con la verruga.

5) Asegurar el apósito en posición con la cinta que viene incluida en el kit.

Retirar el apósito por la mañana (luego de por lo menos ocho horas) y descartar. Repetir cada 24 hs. los pasos 1 al 5. Hasta lograr la eliminación total de la verruga (un máximo de 12 semanas). Por lo general se debe alcanzar una mejoría visible durante los primeros días de tratamiento. La eliminación completa de la verruga aparece luego de un período de 3 a 12 semanas de tratamiento.

Presentación:

Envases con 20 apósitos de 6 mm acompañados de 24 tiras adhesivas, 20 protectores periféricos y 1 lima.

Sobredosificación:

En caso de ingestión accidental, consulte inmediatamente al médico o póngase en contacto con:

·Unidad Toxicológica del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez:
(011) 4962-6666/2247.

·Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Prof. A. Posadas:
(011) 4654-6648 ó 4658-7777.

Condiciones de conservación y almacenamiento:

Conservar a temperatura ambiente menor de 30°C.

“Mantener este y cualquier otro medicamento fuera del alcance de los niños”.

Especialidad Medicinal Autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado N° 49.246.

Director Técnico: Eduardo R. Nasuti, Farmacéutico.

Importado por Laboratorios Andrómaco S.A.I.C.I., Av. Ing. Huergo 1145 - C1107AOL - Bs. As.

Elaborado en U.S.A. por DOAK DERMATOLOGICS

Subsidiario de BRADLEY PHARMACEUTICALS, INC.-383 Route 46 West-New Jersey 070042402.

Fecha de última actualización del prospecto: 03/01.



Andrómaco

Laboratorios Andrómaco S.A.I.C.I.
Av. Ing. Huergo 1145 - C1107AOL - Bs. As.

Servicio de Atención al Consumidor:

0810-666-PIEL (7435)

E-mail: piel@andromaco.com.ar

www.andromaco.com