dermaglós

CREMA

VITAMINA A 600.000 U.I. - VITAMINA E - ALANTOÍNA

Composición: Cada 100 g de crema contiene: Vitamina A Palmitato 600.000 U.I.; Alantoína 0,2500 g; Vitamina E Acetato 0,0500 g; Excipientes (Cloruro de Bencetonio; Dimeticona 100; Ácido Cítrico Anhidro; Alcohol Cetílico; Butilhidroxianisol; Butilhidroxitolueno; Citrato de Sodio; EDTA Disódico; Esencia de Sándalo; Esencia Floral; Palmitato de Cetilo; Glicerina; Lanolina Especial; Metilparabeno; Monoestearato de Glicerilo + PEG 100; Propilparabeno; Sorbitol 70%; Polisorbato 60; Vaselina Líquida; Propilenglicol; Agua Purificada) c.s.

Presentaciones:

Envases conteniendo 50, 100, 200 y 250 g.

EMULSIÓN

VITAMINA A 500.000 U.I. - VITAMINA E - ALANTOÍNA

Composición: Cada 100 ml de emulsión contiene: Vitamina A Palmitato 500.000 U.I.; Alantoína 0,2500 g; Vitamina E Acetato 0,0500 g; Excipientes (Glicerina; Sorbitol 70%; Vaselina Líquida; Propilenglicol; Monoestearato de Glicerilo AE; Dimeticona; Lanolina; Polisorbato 60; Carbomer; Metilparabeno; Cloruro de Bencetonio; Esencia Floral; Esencia de Sándalo; Hidróxido de Sodio; Propilparabeno; Ácido Cítrico; Citrato de Sodio; BHA; BHT; EDTA; Agua Purificada) c.s.

Presentaciones:

Envases conteniendo 100, 200, 250, 400 ml.

Presentaciones de uso hospitalario exclusivo: 500 ml.

dermaglós

VITAMINA A - VITAMINA E - ALANTOÍNA

dermaglós

VITAMINA A - VITAMINA E - ALANTOÍNA

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO, conserve este prospecto dado que contiene información que puede serle útil para volver a leer.
Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aparece cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, consulte a su médico y/o farmacéutico inmediatamente.

Dermaglós Crema y/o Emulsión posee acción protectora, hidratante y regeneradora de la piel.

¿Para qué se usa?

Para el alivio local de las raspaduras, dermatitis, estrías, enfermedades inflamatorias superficiales que afectan principalmente la capa más externa de la piel (eczemas e irritaciones menores).

¿Qué personas no pueden utilizar Dermaglós Crema / Emulsión?

No use este medicamento si Ud. sabe que es alérgico (hipersensible) a alguno de los componentes de la fórmula.

No administrar en menores de 2 años sin supervisión médica.

Si Ud. está tomando algún medicamento, o está embarazada o dando el pecho a su bebé, consulte a su médico antes de utilizar este medicamento.

¿Qué cuidados debe tener antes de usar Dermaglós Crema / Emulsión?

Dada la sensibilidad de la piel o si las lesiones son muy extensas se deben evitar las compresas o la cobertura parcial o total con materiales impermeables o el exceso de aplicaciones dado que se pueden presentar efectos de sobredosificación por reabsorción de la Vitamina A.

Utilizar con cuidado cerca de los ojos.

No administrar en menores de 2 años sin supervisión médica.

No administrar en el embarazo y en los meses posteriores al parto sin supervisión médica.

Si usted está tomando algún medicamento, está embarazada o en período de lactancia, consulte a un médico antes de usar este medicamento.

¿Qué cuidados debe tener mientras está utilizando Dermaglós Crema / Emulsión?

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran. Debido a que existe cierta absorción a través de la piel de la Vitamina A, los riesgos de sufrir efectos indeseables solamente aumentan cuando la superficie sobre la que se aplica es extensa, se emplean vendas, la piel está dañada (particularmente quemada) o se trata de mucosas (capas húmedas que recubren una cavidad abierta al exterior o un conducto del cuerpo; ej. mucosa nasal). Debe tenerse en cuenta que, en caso de uso prolongado y de aplicación en zonas extensas y con la piel muy dañada, si bien no es lo habitual, podrían aparecer síntomas de hipervitaminosis (trastornos provocados por el exceso de una vitamina) como la que se observa con la administración oral de Vitamina A.

¿Cómo se usa Dermaglós Crema / Emulsión?

Aplicar sobre la zona a tratar dos o tres veces por día, según se requiera.

No colocar más de 3 veces por día, no aplicar por tiempo prolongado.

Ante la aparición de nuevos síntomas o de no remitir la sintomatología inicial consultar con su médico inmediatamente.

¿Qué debo hacer ante una sobredosis, o si coloqué más de la cantidad necesaria?

Ante la eventualidad de una ingesta accidental o sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:
- Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez, Tel. (011) 4962-6666/2247;
- Hospital de Niños Pedro de Elizalde, Tel. (011) 4307-4788/5442;
- Hospital A. Posadas, Tel. (011) 4654-6648/4658-7777.

¿Tiene Ud. alguna pregunta?

Comuníquese al siguiente teléfono: ANMAT Responde: 0800 333 1234

Condiciones de conservación y almacenamiento:

Conservar a temperatura ambiente menor de 25°C.

Mantener fuera del alcance de los niños.
Ante cualquier duda consulte a su médico y/o farmacéutico.

Especialidad Medicinal Autorizada por el Ministerio de Salud.
Dermaglós Crema: Cert. Nº 22.626.
Dermaglós Emulsión: Cert. Nº 5.092.
Director Técnico: Juan A. Zubiaga, Farmacéutico.

Fecha de última actualización del prospecto: 02/2026.

Serv. de At. al Consumidor:
0800-333-0033
contacto@andromaco.com.ar
andromaco.com - dermaglos.com

Vía de administración tópica
VENTA LIBRE
Industria Argentina

Andrómaco
Laboratorios Andrómaco S.A.I.C.I.
Av. Ing. Huergo 1145 - C1107AOL - Bs. As.